

## FICHA TÉCNICA



**NOMBRE COMÚN:** Propineb.

**FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:** Polvo mojable que contiene 700 g de ingrediente activo por kg de producto comercial, además de humectantes, adherentes (no se lava fácilmente por la lluvia) y esparcidores especiales, los que aseguran la estabilidad del ANTRACOL, mejorando a la vez considerablemente la distribución y esparcimiento de la sustancia activa del fungicida sobre la superficie aplicada.

**ACCIÓN FITOSANITARIA:** ANTRACOL 70 PM es un fungicida orgánico de acción protectante (trabaja sobre las esporas), de buen efecto inicial y excelente acción persistente. Posee amplio espectro de acción contra hongos que causan numerosas enfermedades en diversos cultivos. Su uso prolongado no produce resistencia. El contenido de Zinc en su formulación, reverdece las plantas tratadas. La coloración de la mezcla casi transparente no interfiere la fotosíntesis de las hojas. ANTRACOL es de finas partículas, por lo cual no taponan las boquillas.

**COMPATIBILIDAD:** Se puede mezclar con la mayoría de insecticidas y fungicidas existentes en el mercado.

**TOXICIDAD:** Categoría Toxicológica IV.  
Toxicidad oral aguda: > 5 000 mg/kg  
Toxicidad dermal aguda: > 5 000 mg/kg  
Toxicidad inhalatoria: > 693 mg/m<sup>3</sup>

**RECOMENDACIONES DE USO:**

**Estados iniciales de cultivo:** 1 funda de 400 g por tanque de 200 litros.

**Mezcla con curativos:** 1 funda de 400 g por tanque de 200 litros más un curativo (500 g de Fitoraz).

**Comienzo de lluvias:** 2 fundas de 500 g por tanque de 200 litros.

**MÉTODO DE EMPLEO:** Para conseguir una buena mezcla se debe diluir la dosis recomendada en un poco de agua hasta conseguir una suspensión homogénea, luego vierta esta premezcla en el tanque del equipo que va a utilizar con la cantidad de agua necesaria. No deje de agitar el contenido.

**PRECAUCIONES:** ANTRACOL 70 PM es un fungicida que pertenece al grupo de plaguicidas ligeramente tóxicos, sin embargo, al aplicarlo deben tomarse medidas necesarias para el manejo de plaguicidas.

**FRECUENCIAS DE APLICACIÓN:** Depende de la incidencia de la enfermedad.

**INTERVALO DE SEGURIDAD:** El tiempo de seguridad a la cosecha para estos cultivos es de 10 días promedio.

**PRECAUCIONES:** El producto puede ser nocivo en caso de inhalación o ingestión. Puede ser tóxico para organismos acuáticos.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

**GUÍA PARA EL MÉDICO:** Aplique tratamiento sintomático.

Para mayor información dirigirse a:

**Para la Sierra:** CIATOX, Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Dra. Consuelo Meneses M, Teléfonos de contacto.: 593- 2- 2906162 Ext. 221/ 593- 2- 2565858 3226268 Línea gratuita: 1800 836366. En caso de intoxicación, derrame o incendio: Cisproquim (Quito, La Sierra, Centro y Norte): 1800-59-3005

**Para la Costa:** CITOX Centro de Información Toxicológico. Dr. Jorge Luis Gaibor Carpio Tel.: (5934)04245-1022 Móvil: 098275025 Fax: (5934)042452700 Ext. 4241. En caso de intoxicación accidental dirigirse al Dr. Alfredo Noboa Montalvo. Celular 09-9426154 (Guayaquil)

**REGISTRO MAG.:** 10 - F

**RECOMENDACIONES DE USO:**

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS Kg/ha
PAPA <i>Solanum tuberosum</i>	Lancha, Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	1.5-2.5
ARROZ <i>Solanum tuberosum</i>	Quemazón <i>Piricularia oryzae</i> Mancha lineal <i>Cercospora oryzae</i> Mancha circular <i>Helminthosporium oryzae</i>	1.5-2.5
SOYA <i>Glycine max</i>	Cercosporiosis <i>Cercospora sojina</i>	1.5-2.0
TOMATE <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón tardío, lancha <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	1.5-2.0
TABACO <i>Nicotiana tabacum</i>	Moho azul <i>Peronospora tabaci</i> Manchado <i>Alternaria spp.</i>	1.0-2.0
CEBOLLA <i>Allium cepa</i>	Mildiu vellosa <i>Peronospora destructor</i> Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i>	1.5-2.0
FRÉJOL <i>Phaseolus vulgaris</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum sp.</i>	1.5-2.0

Bayer S.A.  
Calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan piso 6  
Quito - Ecuador

Tel +593 (2) 3975200  
Línea de Servicio al Cliente 1800-2293772  
www.bayerandina.com

[www.bayercropscience.com.ec](http://www.bayercropscience.com.ec)  
[paul.romero@bayer.com](mailto:paul.romero@bayer.com)  
[luisadrian.espinosa@bayer.com](mailto:luisadrian.espinosa@bayer.com)  
[david.moreno@bayer.com](mailto:david.moreno@bayer.com)